



Handelsbezeichnung	Chrysoperla
Registernummer	4282-0
Art der Zubereitung	Sonstige (XX)
Wirkungstyp	Insektizid, Akarizid

Wirkstoffe

Wirkstoff	Wirkstoffgehalt rein	Einheit	Gew. %	Zusätzliche Angaben	Wirkstoffgruppe
Florfliege (Chrysoperla carnea [CHROCR])					

ZulassungsinhaberIn

Name (Firma)	Anschrift
biohelp Garten & Bienen – Biologische Produkte für Garten, Haus und Imkerei GmbH	Kapleigasse 16 1110 Wien, Österreich

GenehmigungsinhaberIn

Name (Firma)	Anschrift

VertriebsunternehmerIn gem. § 13 PSM-VO 2011

Name (Firma)	Anschrift

Für die Endkennzeichnung Verantwortliche

Name (Firma)	Anschrift
biohelp Garten & Bienen – Biologische Produkte für Garten, Haus und Imkerei GmbH	Kapleigasse 16 1110 Wien, Österreich

Status	zugelassen
Beginn der Zulassung	23.09.2021
Datum der letzten Änderung	22.10.2025
Antrag auf Erneuerung	
Datum der letzten Erneuerung	
Ende der Zulassung	31.08.2036
Abverkaufsfrist	
Aufbrauchsfrist	

Zugelassene Indikationen

Nr. Einsatzgebiet	Kultur/Objekt + Einschränkung	Schadfaktor + Einschränkung	Anwendungsbereich HuK	Art. 51	Art. 53	Befristung von	Befristung bis
1	Zierpflanzenbau	• Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	• Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	Freiland	Nein	Nein	Nein
2	Zierpflanzenbau	• Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	• Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein
3	Zierpflanzenbau	• Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	• Thripse (1THRIF, Thripidae)	Unter Glas	Nein	Nein	Nein
4	Zierpflanzenbau	• Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	• Thripse (1THRIF, Thripidae)	Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas	Ja	Nein	Nein



Nr.	Einsatzgebiet	Kultur/Objekt + Einschränkung	Schadfaktor + Einschränkung	Anwendungsbereich	HuK	Art. 51	Art. 53	Befristung von	Befristung bis
5	Zierpflanzenbau	• Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	• Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae) • Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae)	Unter Glas		Nein	Nein	Nein	
6	Zierpflanzenbau	• Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	• Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae) • Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae)	Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas		Ja	Nein	Nein	
7	Gemüsebau	• Gemüsekulturen (3VEGC)	• Thripse (1THYSO, Thysanoptera) • Blattläuse (1APHIF, Aphis fabae, Myzus persicae)	Freiland		Nein	Nein	Nein	
8	Gemüsebau	• Gemüsekulturen (3VEGC)	• Spinnmilben (TETRSP, Tetranychus sp.)	Freiland		Nein	Nein	Nein	
9	Gemüsebau	• Gemüsekulturen (3VEGC)	• Blattläuse (1APHIF, Aphididae) • Thripse (1THRIF, Thripidae)	Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas		Ja	Nein	Nein	
10	Gemüsebau	• Gemüsekulturen (3VEGC)	• Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae)	Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas		Ja	Nein	Nein	
11	Gemüsebau	• Gemüsekulturen (3VEGC)	• Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae)	Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas		Ja	Nein	Nein	
12	Gemüsebau	• Gemüsekulturen (3VEGC)	• Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae)	Freiland		Nein	Nein	Nein	
13	Obstbau	• Erdbeeren (FRAAN)	• Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	Freiland		Nein	Nein	Nein	
14	Obstbau	• Beerenobst (3SMFC) Ausgenommen Erdbeeren	• Blattläuse (1APHIF, Aphididae) • Thripse (1THRIF, Thripidae)	Freiland		Nein	Nein	Nein	
15	Obstbau	• Beerenobst (3SMFC) Ausgenommen Erdbeeren	• Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae)	Freiland		Nein	Nein	Nein	
16	Obstbau	• Steinobst (3STFC) • Kernobst (3PMFC)	• Blattläuse (1APHIF, Aphididae) • Thripse (1THRIF, Thripidae)	Freiland		Nein	Nein	Nein	
17	Obstbau	• Steinobst (3STFC) • Kernobst (3PMFC)	• Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae)	Freiland		Nein	Nein	Nein	
18	Obstbau	• Erdbeeren (FRAAN)	• Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland, Unter Glas		Ja	Nein	Nein	
19	Obstbau	• Kernobst (3PMFC)	• Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland		Ja	Nein	Nein	
20	Zierpflanzenbau	• Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	• Woll- oder Schmierläuse (1PSEUF, Pseudococcidae)	Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas		Ja	Nein	Nein	
21	Zierpflanzenbau	• Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	• Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	Unter Glas		Nein	Nein	Nein	
22	Gemüsebau	• Gemüsekulturen (3VEGC)	• Thripse (1THYSO, Thysanoptera) • Blattläuse (1APHIF, Aphis fabae, Myzus persicae)	Unter Glas		Nein	Nein	Nein	
23	Gemüsebau	• Gemüsekulturen (3VEGC)	• Spinnmilben (TETRSP, Tetranychus sp.)	Unter Glas		Nein	Nein	Nein	



Nr.	Einsatzgebiet	Kultur/Objekt + Einschränkung	Schadfaktor + Einschränkung	Anwendungsbereich HuK	Art. 51	Art. 53	Befristung von	Befristung bis
24	Gemüsebau	• Gemüsekulturen (3VEGC)	• Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae)	Unter Glas	Nein	Nein	Nein	
25	Obstbau	• Erdbeeren (FRAAN)	• Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	Unter Glas	Nein	Nein	Nein	
26	Obstbau	• Beerenobst (3SMFC) <i>Ausgenommen Erdbeeren</i>	• Blattläuse (1APHIF, Aphididae) • Thripse (1THRIF, Thripidae)	Unter Glas	Nein	Nein	Nein	
27	Obstbau	• Beerenobst (3SMFC) <i>Ausgenommen Erdbeeren</i>	• Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae)	Unter Glas	Nein	Nein	Nein	
28	Zierpflanzenbau	• Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	• Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	Freiland	Nein	Nein	Nein	
29	Zierpflanzenbau	• Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	• Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	Unter Glas	Nein	Nein	Nein	
30	Zierpflanzenbau	• Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	• Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein	
31	Zierpflanzenbau	• Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	• Thripse (1THRIF, Thripidae)	Unter Glas	Nein	Nein	Nein	
32	Zierpflanzenbau	• Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	• Thripse (1THRIF, Thripidae)	Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas	Ja	Nein	Nein	
33	Zierpflanzenbau	• Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	• Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae) • Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae)	Unter Glas	Nein	Nein	Nein	
34	Zierpflanzenbau	• Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	• Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae) • Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae)	Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas	Ja	Nein	Nein	
35	Gemüsebau	• Gemüsekulturen (3VEGC)	• Thripse (1THYSO, Thysanoptera) • Blattläuse (1APHIF, Aphis fabae, Myzus persicae)	Freiland	Nein	Nein	Nein	
36	Gemüsebau	• Gemüsekulturen (3VEGC)	• Thripse (1THYSO, Thysanoptera) • Blattläuse (1APHIF, Aphis fabae, Myzus persicae)	Unter Glas	Nein	Nein	Nein	
37	Gemüsebau	• Gemüsekulturen (3VEGC)	• Spinnmilben (TETRSP, Tetranychus sp.)	Freiland	Nein	Nein	Nein	
38	Gemüsebau	• Gemüsekulturen (3VEGC)	• Spinnmilben (TETRSP, Tetranychus sp.)	Unter Glas	Nein	Nein	Nein	
39	Gemüsebau	• Gemüsekulturen (3VEGC)	• Blattläuse (1APHIF, Aphididae) • Thripse (1THRIF, Thripidae)	Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas	Ja	Nein	Nein	
40	Gemüsebau	• Gemüsekulturen (3VEGC)	• Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae)	Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas	Ja	Nein	Nein	
41	Gemüsebau	• Gemüsekulturen (3VEGC)	• Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae)	Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas	Ja	Nein	Nein	
42	Gemüsebau	• Gemüsekulturen (3VEGC)	• Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae)	Freiland	Nein	Nein	Nein	



Nr.	Einsatzgebiet	Kultur/Objekt + Einschränkung	Schadfaktor + Einschränkung	Anwendungsbereich	HuK	Art. 51	Art. 53	Befristung von	Befristung bis
43	Gemüsebau	• Gemüsekulturen (3VEGC)	• Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae)	Unter Glas		Nein	Nein	Nein	
44	Obstbau	• Erdbeeren (FRAAN)	• Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	Unter Glas		Nein	Nein	Nein	
45	Obstbau	• Beerenobst (3SMFC) <i>Ausgenommen Erdbeeren</i>	• Blattläuse (1APHIF, Aphididae) • Thripse (1THRIF, Thripidae)	Freiland		Nein	Nein	Nein	
46	Obstbau	• Erdbeeren (FRAAN)	• Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	Freiland		Nein	Nein	Nein	
47	Obstbau	• Beerenobst (3SMFC) <i>Ausgenommen Erdbeeren</i>	• Blattläuse (1APHIF, Aphididae) • Thripse (1THRIF, Thripidae)	Unter Glas		Nein	Nein	Nein	
48	Obstbau	• Beerenobst (3SMFC) <i>Ausgenommen Erdbeeren</i>	• Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae)	Freiland		Nein	Nein	Nein	
49	Obstbau	• Beerenobst (3SMFC) <i>Ausgenommen Erdbeeren</i>	• Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae)	Unter Glas		Nein	Nein	Nein	
50	Obstbau	• Steinobst (3STFC) • Kernobst (3PMFC)	• Blattläuse (1APHIF, Aphididae) • Thripse (1THRIF, Thripidae)	Freiland		Nein	Nein	Nein	
51	Obstbau	• Steinobst (3STFC) • Kernobst (3PMFC)	• Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae)	Freiland		Nein	Nein	Nein	
52	Obstbau	• Erdbeeren (FRAAN)	• Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	Haus- und Kleingartengebereich: Freiland, Unter Glas		Ja	Nein	Nein	
53	Obstbau	• Kernobst (3PMFC)	• Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	Haus- und Kleingartengebereich: Freiland		Ja	Nein	Nein	
54	Zierpflanzenbau	• Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	• Woll- oder Schmierläuse (1PSEUF, Pseudococcidae)	Haus- und Kleingartengebereich: Unter Glas		Ja	Nein	Nein	



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Gefahrenklassen und Gefahrenhinweise

Gefahrenklasse	Gefahrenkategorie	Piktogramm	Signalwort	H-Satz	Gefahrenhinweis
----------------	-------------------	------------	------------	--------	-----------------

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text	Betroffene Indikationen
P101	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.	
P102	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.	
P270	Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.	

Ergänzende Gefahrenmerkmale

EUH-Satz	
EUH401	Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Betroffene Indikationen	
Vorsicht, Pflanzenschutzmittel!	
Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren.	
Originalverpackung oder entleerte Behälter nicht zu anderen Zwecken verwenden.	

Sonstige Auflagen und Hinweise

Betroffene Indikationen	
-------------------------	--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Betroffene Indikationen	
Die Angaben zu Aufwandmenge, Anwendungszeitpunkt, maximale Anzahl der Anwendungen und zeitlicher Abstand in Tagen stellen Richtwerte dar und können gegebenenfalls in Verantwortung des Verwenders an die betriebs- und kulturspezifische Situation angepasst werden.	
Das Pflanzenschutzmittel (Nützlingspräparat) ist nicht uneingeschränkt mit chemischen Pflanzenschutzmaßnahmen kombinierbar.	

Weitere Auflagen und Hinweise siehe oben.



Zusätzliche Angaben gem. § 5 Abs. 2 Z 5 und 6 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011 idgF.

Herkunftsmitgliedsstaat

Handelsbezeichnung

Zulassungsnummer



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr.	1
Einsatzgebiet	Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	

Anwendungsbereich	Freiland
HuK	Nein
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
5.000.000	Individuen/ha	max.				---
		Pflanzenhöhe 50 – 125 cm: 200.000 – 300.000 Individuen/ha				---
		Pflanzenhöhe über 125 cm: 300.000 – 500.000 Individuen/ha				---
		Pflanzenhöhe bis 50 cm: 100.000 – 200.000 Individuen/ha				---

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in Nach Bedarf
dieser Anwendung

Max. Anzahl der Behandlungen in der Nach Bedarf
Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 mind.

Anwendungsart Ausstreuen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr.	2
Einsatzgebiet	Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	

Anwendungsbereich	Haus- und Kleingartengrenzbereich: Freiland
-------------------	---

HuK	Ja
-----	----

Art. 51	Nein
---------	------

Art. 53	Nein
---------	------

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
50	Individuen/m ²	max.				
		Pflanzenhöhe über 125 cm: 30 - 50 Individuen/m ²				---
		Pflanzenhöhe bis 50 cm: 10 - 20 Individuen/m ²				---
		Pflanzenhöhe 50 - 125 cm: 20 - 30 Individuen/m ²				---

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome bzw. Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	Nach Bedarf
--	-------------

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	Nach Bedarf
---	-------------

Zeitlicher Abstand in Tagen	14 mind.
-----------------------------	----------

Anwendungsart	Ausstreuen auf die befallenen Pflanzen
---------------	--

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	---
---------------------	-----

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--

Kommentar	
-----------	--



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr.	3
Einsatzgebiet	Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Thripse (1THRIF, Thripidae)	

Anwendungsbereich	Unter Glas
HuK	Nein
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
5.000	Individuen/100 m ²	max.				---
		Pflanzenhöhe 50 – 125 cm: 2.000 – 3.000 Individuen/100 m ²				---
		Pflanzenhöhe über 125 cm: 3.000 – 5.000 Individuen/100 m ²				---
		Pflanzenhöhe bis 50 cm: 1.000 – 2.000 Individuen/100 m ²				---

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	Nach Bedarf
--	-------------

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	Nach Bedarf
---	-------------

Zeitlicher Abstand in Tagen	14 mind.
-----------------------------	----------

Anwendungsart	Ausstreuen
---------------	------------

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	---
---------------------	-----

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--

Kommentar	
-----------	--



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr.	4
Einsatzgebiet	Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Thripse (1THRIF, Thripidae)	

Anwendungsbereich	Haus- und Kleingartengrenbereich: Unter Glas
-------------------	--

HuK	Ja
-----	----

Art. 51	Nein
---------	------

Art. 53	Nein
---------	------

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
50	Individuen/m ²	max.				
		Pflanzenhöhe über 125 cm: 30 - 50 Individuen/m ²				---
		Pflanzenhöhe bis 50 cm: 10 - 20 Individuen/m ²				---
		Pflanzenhöhe 50 - 125 cm: 20 - 30 Individuen/m ²				---

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome bzw. Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	Nach Bedarf
--	-------------

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	Nach Bedarf
---	-------------

Zeitlicher Abstand in Tagen	14 mind.
-----------------------------	----------

Anwendungsart	Ausstreuen auf die befallenen Pflanzen
---------------	--

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	---
---------------------	-----

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--

Kommentar	
-----------	--



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr.	5
Einsatzgebiet	Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae)	
Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae)	

Anwendungsbereich	Unter Glas
HuK	Nein
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
5.000	Individuen/100 m ²	max.				---
		Pflanzenhöhe 50 – 125 cm: 2.000 – 3.000 Individuen/100 m ²				---
		Pflanzenhöhe über 125 cm: 3.000 – 5.000 Individuen/100 m ²				---
		Pflanzenhöhe bis 50 cm: 1.000 – 2.000 Individuen/100 m ²				---

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	Nach Bedarf
--	-------------

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	Nach Bedarf
---	-------------

Zeitlicher Abstand in Tagen	14 mind.
-----------------------------	----------

Anwendungsart	Ausstreuen
---------------	------------

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	---
---------------------	-----

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr.	6
Einsatzgebiet	Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae)	
Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae)	

Anwendungsbereich	Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas
-------------------	--

HuK	Ja
-----	----

Art. 51	Nein
---------	------

Art. 53	Nein
---------	------

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
50	Individuen/m ²	max.				
		Pflanzenhöhe über 125 cm: 30 - 50 Individuen/m ²				---
		Pflanzenhöhe bis 50 cm: 10 - 20 Individuen/m ²				---
		Pflanzenhöhe 50 - 125 cm: 20 - 30 Individuen/m ²				---

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome bzw. Schadorganismen				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	Nach Bedarf
--	-------------

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	Nach Bedarf
---	-------------

Zeitlicher Abstand in Tagen	14 mind.
-----------------------------	----------

Anwendungsart	Ausstreuen auf die befallenen Pflanzen
---------------	--

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	---
---------------------	-----

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr.	7
Einsatzgebiet	Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gemüsekulturen (3VEGC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Thripse (1THYSO, Thysanoptera)	
Blattläuse (1APHIF, Aphis fabae, Myzus persicae)	

Anwendungsbereich	Freiland
HuK	Nein
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
500.000	Individuen/ha	max.				---
		Pflanzenhöhe 50 – 125 cm: 200.000 – 300.000 Individuen/ha				---
		Pflanzenhöhe über 125 cm: 300.000 – 500.000 Individuen/ha				---
		Pflanzenhöhe bis 50 cm: 100.000 – 200.000 Individuen/ha				---

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 mind.

Anwendungsart Ausstreuen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr.	8
Einsatzgebiet	Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gemüsekulturen (3VEGC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Spinnmilben (TETRSP, Tetranychus sp.)	

Anwendungsbereich	Freiland
-------------------	----------

HuK	Nein
-----	------

Art. 51	Nein
---------	------

Art. 53	Nein
---------	------

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
500.000	Individuen/ha	max.				---
		Pflanzenhöhe 50 – 125 cm: 200.000 – 300.000 Individuen/ha				---
		Pflanzenhöhe über 125 cm: 300.000 – 500.000 Individuen/ha				---
		Pflanzenhöhe bis 50 cm: 100.000 – 200.000 Individuen/ha				---

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	Nach Bedarf
--	-------------

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	Nach Bedarf
---	-------------

Zeitlicher Abstand in Tagen	14 mind.
-----------------------------	----------

Anwendungsart	Ausstreuen
---------------	------------

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	---
---------------------	-----

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--

Kommentar	
-----------	--



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr.	9
Einsatzgebiet	Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gemüsekulturen (3VEGC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	
Thripse (1THRIF, Thripidae)	

Anwendungsbereich	Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas
-------------------	--

HuK	Ja
-----	----

Art. 51	Nein
---------	------

Art. 53	Nein
---------	------

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
50	Individuen/m ²	max.				
		Pflanzenhöhe über 125 cm: 30 - 50 Individuen/m ²				---
		Pflanzenhöhe bis 50 cm: 10 - 20 Individuen/m ²				---
		Pflanzenhöhe 50 - 125 cm: 20 - 30 Individuen/m ²				---

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome bzw. Schadorganismen				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	Nach Bedarf
--	-------------

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	Nach Bedarf
---	-------------

Zeitlicher Abstand in Tagen	14 mind.
-----------------------------	----------

Anwendungsart	Ausstreuen auf die befallenen Pflanzen
---------------	--

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	---
---------------------	-----

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr.	10
Einsatzgebiet	Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gemüsekulturen (3VEGC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae)	

Anwendungsbereich	Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas
-------------------	--

HuK	Ja
-----	----

Art. 51	Nein
---------	------

Art. 53	Nein
---------	------

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
50	Individuen/m ²	max.				---
		Pflanzenhöhe über 125 cm: 30 - 50 Individuen/m ²				---
		Pflanzenhöhe bis 50 cm: 10 - 20 Individuen/m ²				---
		Pflanzenhöhe 50 - 125 cm: 20 - 30 Individuen/m ²				---

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome bzw. Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	Nach Bedarf
--	-------------

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	Nach Bedarf
---	-------------

Zeitlicher Abstand in Tagen	14 mind.
-----------------------------	----------

Anwendungsart	Ausstreuen auf die befallenen Pflanzen
---------------	--

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	---
---------------------	-----

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--

Kommentar	
-----------	--



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr.	11
Einsatzgebiet	Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gemüsekulturen (3VEGC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae)	

Anwendungsbereich	Haus- und Kleingartengrenbereich: Unter Glas
-------------------	--

HuK	Ja
-----	----

Art. 51	Nein
---------	------

Art. 53	Nein
---------	------

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
50	Individuen/m ²	max.				---
		Pflanzenhöhe 50 - 125 cm: 20 -30 Individuen /m ²				---
		Pflanzenhöhe über 125 cm: 30 -50 Individuen /m ²				---
		Pflanzenhöhe bis 50 cm: 10 - 20 Individuen/m ²				---

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome bzw. Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	Nach Bedarf
--	-------------

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	Nach Bedarf
---	-------------

Zeitlicher Abstand in Tagen	14 mind.
-----------------------------	----------

Anwendungsart	Ausstreuen auf die befallenen Pflanzen
---------------	--

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	---
---------------------	-----

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--

Kommentar	
-----------	--



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr. 12
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gemüsekulturen (3VEGC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae)	

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
500.000	Individuen/ha	max.				---
		Pflanzenhöhe 50 – 125 cm: 200.000 – 300.000 Individuen/ha				---
		Pflanzenhöhe über 125 cm: 300.000 – 500.000 Individuen/ha				---
		Pflanzenhöhe bis 50 cm: 100.000 – 200.000 Individuen/ha				---

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in Nach Bedarf
dieser Anwendung

Max. Anzahl der Behandlungen in der Nach Bedarf
Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 mind.

Anwendungsart Ausstreuen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr.	13
Einsatzgebiet	Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Erdbeeren (FRAAN)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	

Anwendungsbereich	Freiland
HuK	Nein
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
100.000 - 300.000	Individuen/ha				---	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 mind.

Anwendungsart Ausstreuen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr.	14
Einsatzgebiet	Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Beerenobst (3SMFC)	Ausgenommen Erdbeeren

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	
Thripse (1THRIF, Thripidae)	

Anwendungsbereich	Freiland
HuK	Nein
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
500.000	Individuen/ha	max.				---
		Pflanzenhöhe 50 – 125 cm: 200.000 – 300.000 Individuen/ha				---
		Pflanzenhöhe über 125 cm: 300.000 – 500.000 Individuen/ha				---
		Pflanzenhöhe bis 50 cm: 100.000 – 200.000 Individuen/ha				---

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	Nach Bedarf
--	-------------

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	Nach Bedarf
---	-------------

Zeitlicher Abstand in Tagen	14 mind.
-----------------------------	----------

Anwendungsart	Ausstreuen
---------------	------------

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	---
---------------------	-----

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr.	15
Einsatzgebiet	Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Beerenobst (3SMFC)	Ausgenommen Erdbeeren

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae)	

Anwendungsbereich	Freiland
HuK	Nein
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
500.000	Individuen/ha	max.				---
		Pflanzenhöhe 50 – 125 cm: 200.000 – 300.000 Individuen/ha				---
		Pflanzenhöhe über 125 cm: 300.000 – 500.000 Individuen/ha				---
		Pflanzenhöhe bis 50 cm: 100.000 – 200.000 Individuen/ha				---

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in Nach Bedarf
dieser Anwendung

Max. Anzahl der Behandlungen in der Nach Bedarf
Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 mind.

Anwendungsart Ausstreuen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr.	16
Einsatzgebiet	Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Steinobst (3STFC)	
Kernobst (3PMFC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	
Thripse (1THRIF, Thripidae)	

Anwendungsbereich	Freiland
HuK	Nein
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
500.000	Individuen/ha	max.				---
		50.000 - 250.000 Individuen/ha/m Kronenhöhe				---

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in
dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der
Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 mind.

Anwendungsart Ausstreuen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr.	17
Einsatzgebiet	Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Steinobst (3STFC)	
Kernobst (3PMFC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae)	

Anwendungsbereich	Freiland
HuK	Nein
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
500.000	Individuen/ha	max.				---
		50.000 - 250.000 Individuen/ha/m Kronenhöhe				---

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 mind.

Anwendungsart Ausstreuen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr.	18
Einsatzgebiet	Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Erdbeeren (FRAAN)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	

Anwendungsbereich	Haus- und Kleingartengebiet: Freiland, Unter Glas
-------------------	---

HuK	Ja
-----	----

Art. 51	Nein
---------	------

Art. 53	Nein
---------	------

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
10 - 30 Individuen/m ²					---	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome bzw. Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	Nach Bedarf
--	-------------

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	Nach Bedarf
---	-------------

Zeitlicher Abstand in Tagen	14 mind.
-----------------------------	----------

Anwendungsart	Ausstreuen auf die befallenen Pflanzen
---------------	--

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	---
---------------------	-----

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr. 19
Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kernobst (3PMFC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
50	Individuen/m ²	max.			---	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome bzw. Schadorganismen				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 mind.

Anwendungsart Ausstreuen auf die befallenen Pflanzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr.	20
Einsatzgebiet	Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Woll- oder Schmierläuse (1PSEUF, Pseudococcidae)	

Anwendungsbereich	Haus- und Kleingartengrenzbereich: Unter Glas
-------------------	---

HuK	Ja
-----	----

Art. 51	Nein
---------	------

Art. 53	Nein
---------	------

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
50	Individuen/m ²	max.				---
		Pflanzenhöhe 50 - 125 cm: 20 -30 Individuen/m ²				---
		Pflanzenhöhe über 125 cm: 30 -50 Individuen/m ²				---
		Pflanzenhöhe bis 50 cm: 10 - 20 Individuen/m ²				---

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome bzw. Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	Nach Bedarf
--	-------------

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	Nach Bedarf
---	-------------

Zeitlicher Abstand in Tagen	14 mind.
-----------------------------	----------

Anwendungsart	Ausstreuen auf die befallenen Pflanzen
---------------	--

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	---
---------------------	-----

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--

Kommentar	
-----------	--



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr.	21
Einsatzgebiet	Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	

Anwendungsbereich	Unter Glas
HuK	Nein
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
5.000	Individuen/100 m ²	max.				---
		Pflanzenhöhe 50 – 125 cm: 2.000 – 3.000 Individuen/100 m ²				---
		Pflanzenhöhe über 125 cm: 3.000 – 5.000 Individuen/100 m ²				---
		Pflanzenhöhe bis 50 cm: 1.000 – 2.000 Individuen/100 m ²				---

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in Nach Bedarf
dieser Anwendung

Max. Anzahl der Behandlungen in der Nach Bedarf
Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 mind.

Anwendungsart Ausstreuen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr.	22
Einsatzgebiet	Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gemüsekulturen (3VEGC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Thripse (1THYSO, Thysanoptera)	
Blattläuse (1APHIF, Aphis fabae, Myzus persicae)	

Anwendungsbereich	Unter Glas
HuK	Nein
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
5.000	Individuen/100 m ²	max.				---
		Pflanzenhöhe 50 – 125 cm: 2.000 – 3.000 Individuen/100 m ²				---
		Pflanzenhöhe über 125 cm: 3.000 – 5.000 Individuen/100 m ²				---
		Pflanzenhöhe bis 50 cm: 1.000 – 2.000 Individuen/100 m ²				---

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	Nach Bedarf
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	Nach Bedarf

Zeitlicher Abstand in Tagen	14 mind.
Anwendungsart	Ausstreuen

Nachbaufrist in Tagen	---
Wartefrist in Tagen	---

Abverkaufsfrist	
Aufbrauchsfrist	

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr.	23
Einsatzgebiet	Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gemüsekulturen (3VEGC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Spinnmilben (TETRSP, Tetranychus sp.)	

Anwendungsbereich	Unter Glas
-------------------	------------

HuK	Nein
-----	------

Art. 51	Nein
---------	------

Art. 53	Nein
---------	------

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
5.000	Individuen/100 m ²	max.				---
		Pflanzenhöhe 50 – 125 cm: 2.000 – 3.000 Individuen/100 m ²				---
		Pflanzenhöhe über 125 cm: 3.000 – 5.000 Individuen/100 m ²				---
		Pflanzenhöhe bis 50 cm: 1.000 – 2.000 Individuen/100 m ²				---

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	Nach Bedarf
--	-------------

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	Nach Bedarf
---	-------------

Zeitlicher Abstand in Tagen	14 mind.
-----------------------------	----------

Anwendungsart	Ausstreuen
---------------	------------

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	---
---------------------	-----

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr.	24
Einsatzgebiet	Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gemüsekulturen (3VEGC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae)	

Anwendungsbereich	Unter Glas
HuK	Nein
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
5.000	Individuen/100 m ²	max.				---
		Pflanzenhöhe 50 – 125 cm: 2.000 – 3.000 Individuen/100 m ²				---
		Pflanzenhöhe über 125 cm: 3.000 – 5.000 Individuen/100 m ²				---
		Pflanzenhöhe bis 50 cm: 1.000 – 2.000 Individuen/100 m ²				---

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in Nach Bedarf
dieser Anwendung

Max. Anzahl der Behandlungen in der Nach Bedarf
Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 Mind.

Anwendungsart Ausstreuen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr.	25
Einsatzgebiet	Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Erdbeeren (FRAAN)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	

Anwendungsbereich	Unter Glas
HuK	Nein
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1.000 - 3.000 Individuen/100 m ²					---	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 mind.

Anwendungsart Ausstreuen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr.	26
Einsatzgebiet	Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Beerenobst (3SMFC)	Ausgenommen Erdbeeren

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	
Thripse (1THRIF, Thripidae)	

Anwendungsbereich	Unter Glas
HuK	Nein
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
5.000	Individuen/100 m ²	Max.				---
		Pflanzenhöhe 50 – 125 cm: 2.000 – 3.000 Individuen/100 m ²				---
		Pflanzenhöhe über 125 cm: 3.000 – 5.000 Individuen/100 m ²				---
		Pflanzenhöhe bis 50 cm: 1.000 – 2.000 Individuen/100 m ²				---

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	Nach Bedarf
--	-------------

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	Nach Bedarf
---	-------------

Zeitlicher Abstand in Tagen	14 mind.
-----------------------------	----------

Anwendungsart	Ausstreuen
---------------	------------

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	---
---------------------	-----

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr.	27
Einsatzgebiet	Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Beerenobst (3SMFC)	Ausgenommen Erdbeeren

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae)	

Anwendungsbereich	Unter Glas
-------------------	------------

HuK	Nein
-----	------

Art. 51	Nein
---------	------

Art. 53	Nein
---------	------

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
5.000	Individuen/100 m ²	Max.				---
		Pflanzenhöhe 50 – 125 cm: 2.000 – 3.000 Individuen/100 m ²				---
		Pflanzenhöhe über 125 cm: 3.000 – 5.000 Individuen/100 m ²				---
		Pflanzenhöhe bis 50 cm: 1.000 – 2.000 Individuen/100 m ²				---

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	Nach Bedarf
--	-------------

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	Nach Bedarf
---	-------------

Zeitlicher Abstand in Tagen	14 mind.
-----------------------------	----------

Anwendungsart	Ausstreuen
---------------	------------

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	---
---------------------	-----

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr.	28
Einsatzgebiet	Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	

Anwendungsbereich	Freiland
HuK	Nein
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1.000.000	Eier/ha	max.				---
		Pflanzenhöhe 50 – 125 cm: 500.000 – 1 Mio. Eier/ha				
		Pflanzenhöhe über 125 cm: 1 Mio. Eier/ha				
		Pflanzenhöhe bis 50 cm: 500.000 Eier/ha				

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in
dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der
Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 mind.

Anwendungsart Aufhängen der Kärtchen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr.	29
Einsatzgebiet	Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	

Anwendungsbereich	Unter Glas
HuK	Nein
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
10.000	Eier/100 m ²	max.				---
		Pflanzenhöhe 50 – 125 cm: 5.000 – 10.000 Eier/100 m ²				
		Pflanzenhöhe über 125 cm: 10.000 Eier/100 m ²				
		Pflanzenhöhe bis 50 cm: 5.000 Eier/100 m ²				

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in
dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der
Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 mind.

Anwendungsart Aufhängen der Kärtchen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr.	30
Einsatzgebiet	Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	

Anwendungsbereich	Haus- und Kleingartengrenzbereich: Freiland
-------------------	---

HuK	Ja
-----	----

Art. 51	Nein
---------	------

Art. 53	Nein
---------	------

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
100	Eier/m ²	max.				
		Pflanzenhöhe über 125 cm: 100 Eier/m ²				---
		Pflanzenhöhe bis 50 cm: 50 Eier/m ²				---
		Pflanzenhöhe 50 - 125 cm: 50 - 100 Eier/m ²				---

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome bzw. Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	Nach Bedarf
--	-------------

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	Nach Bedarf
---	-------------

Zeitlicher Abstand in Tagen	14 mind.
-----------------------------	----------

Anwendungsart	Aufhängen der Kärtchen
---------------	------------------------

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	---
---------------------	-----

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr.	31
Einsatzgebiet	Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Thripse (1THRIF, Thripidae)	

Anwendungsbereich	Unter Glas
HuK	Nein
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
10.000	Eier/100 m ²	max.				---
		Pflanzenhöhe 50 – 125 cm: 5.000 – 10.000 Eier/100 m ²				---
		Pflanzenhöhe über 125 cm: 10.000 Eier/100 m ²				---
		Pflanzenhöhe bis 50 cm: 5.000 Eier/100 m ²				---

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in Nach Bedarf
dieser Anwendung

Max. Anzahl der Behandlungen in der Nach Bedarf
Kultur bzw. je Jahr

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 mind.

Anwendungsart Aufhängen der Kärtchen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr.	32
Einsatzgebiet	Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Thripse (1THRIF, Thripidae)	

Anwendungsbereich	Haus- und Kleingartengrenbereich: Unter Glas
-------------------	--

HuK	Ja
-----	----

Art. 51	Nein
---------	------

Art. 53	Nein
---------	------

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
100	Eier/m ²	max.				
		Pflanzenhöhe über 125 cm: 100 Eier/m ²				---
		Pflanzenhöhe bis 50 cm: 50 Eier/m ²				---
		Pflanzenhöhe 50 - 125 cm: 50 - 100 Eier/m ²				---

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome bzw. Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	Nach Bedarf
--	-------------

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	Nach Bedarf
---	-------------

Zeitlicher Abstand in Tagen	14 mind.
-----------------------------	----------

Anwendungsart	Aufhängen der Kärtchen
---------------	------------------------

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	---
---------------------	-----

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr.	33
Einsatzgebiet	Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae)	
Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae)	

Anwendungsbereich	Unter Glas
HuK	Nein
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
10.000	Eier/100 m ²	max.				---
		Pflanzenhöhe 50 – 125 cm: 5.000 – 10.000 Eier/100 m ²				---
		Pflanzenhöhe über 125 cm: 10.000 Eier/100 m ²				---
		Pflanzenhöhe bis 50 cm: 5.000 Eier/100 m ²				---

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 mind.

Anwendungsart Aufhängen der Kärtchen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr.	34
Einsatzgebiet	Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae)	
Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae)	

Anwendungsbereich	Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas
-------------------	--

HuK	Ja
-----	----

Art. 51	Nein
---------	------

Art. 53	Nein
---------	------

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
100	Eier/m ²	max.				
		Pflanzenhöhe über 125 cm: 100 Eier/m ²				---
		Pflanzenhöhe bis 50 cm: 50 Eier/m ²				---
		Pflanzenhöhe 50 - 125 cm: 50 - 100 Eier/m ²				---

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome bzw. Schadorganismen				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	Nach Bedarf
--	-------------

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	Nach Bedarf
---	-------------

Zeitlicher Abstand in Tagen	14 mind.
-----------------------------	----------

Anwendungsart	Aufhängen der Kärtchen
---------------	------------------------

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	---
---------------------	-----

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr.	35
Einsatzgebiet	Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gemüsekulturen (3VEGC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Thripse (1THYSO, Thysanoptera)	
Blattläuse (1APHIF, Aphis fabae, Myzus persicae)	

Anwendungsbereich	Freiland
HuK	Nein
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1.000.000	Eier/ha	max.				---
		Pflanzenhöhe 50 – 125 cm: 500.000 – 1 Mio. Eier/ha				---
		Pflanzenhöhe über 125 cm: 1 Mio. Eier/ha				---
		Pflanzenhöhe bis 50 cm: 500.000 Eier/ha				---

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 mind.

Anwendungsart Aufhängen der Kärtchen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr.	36
Einsatzgebiet	Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gemüsekulturen (3VEGC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Thripse (1THYSO, Thysanoptera)	
Blattläuse (1APHIF, Aphis fabae, Myzus persicae)	

Anwendungsbereich	Unter Glas
HuK	Nein
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
10.000	Eier/100 m ²	max.				---
		Pflanzenhöhe 50 – 125 cm: 5.000 – 10.000 Eier/100 m ²				---
		Pflanzenhöhe über 125 cm: 10.000 Eier/100 m ²				---
		Pflanzenhöhe bis 50 cm: 5.000 Eier/100 m ²				---

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 mind.

Anwendungsart Aufhängen der Kärtchen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr. 37
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gemüsekulturen (3VEGC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Spinnmilben (TETRSP, Tetranychus sp.)	

Anwendungsbereich Freiland

HuK Nein

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1.000.000	Eier/ha	max.				---
		Pflanzenhöhe 50 – 125 cm: 500.000 – 1 Mio. Eier/ha				---
		Pflanzenhöhe über 125 cm: 1 Mio. Eier/ha				---
		Pflanzenhöhe bis 50 cm: 500.0000 Eier/ha				---

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in
dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der
Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 mind.

Anwendungsart Aufhängen der Kärtchen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr.	38
Einsatzgebiet	Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gemüsekulturen (3VEGC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Spinnmilben (TETRSP, Tetranychus sp.)	

Anwendungsbereich	Unter Glas
HuK	Nein
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
10.000	Eier/100 m ²	max.				---
		Pflanzenhöhe 50 – 125 cm: 5.000 – 10.000 Eier/100 m ²				---
		Pflanzenhöhe über 125 cm: 10.000 Eier/100 m ²				---
		Pflanzenhöhe bis 50 cm: 5.000 Eier/100 m ²				---

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in
dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der
Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 mind.

Anwendungsart Aufhängen der Kärtchen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr. 39
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gemüsekulturen (3VEGC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	
Thripse (1THRIF, Thripidae)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
100	Eier/m ²	max.				
		Pflanzenhöhe über 125 cm: 100 Eier/m ²				---
		Pflanzenhöhe bis 50 cm: 50 Eier/m ²				---
		Pflanzenhöhe 50 - 125 cm: 50 - 100 Eier/m ²				---

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome bzw. Schadorganismen				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 mind.

Anwendungsart Aufhängen der Kärtchen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr. 40
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gemüsekulturen (3VEGC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
100	Eier/m ²	max.				---
		Pflanzenhöhe über 125 cm: 100 Eier/m ²				---
		Pflanzenhöhe bis 50 cm: 50 Eier/m ²				---
		Pflanzenhöhe 50 - 125 cm: 50 - 100 Eier/m ²				---

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome bzw. Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 mind.

Anwendungsart Aufhängen der Kärtchen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr.	41
Einsatzgebiet	Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gemüsekulturen (3VEGC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae)	

Anwendungsbereich	Haus- und Kleingartengrenbereich: Unter Glas
-------------------	--

HuK	Ja
-----	----

Art. 51	Nein
---------	------

Art. 53	Nein
---------	------

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
100	Eier/m ²	max.				---
		Pflanzenhöhe 50 - 125 cm: 50 - 100 Eier/m ²				---
		Pflanzenhöhe über 125 cm: 100 Eier/m ²				---
		Pflanzenhöhe bis 50 cm: 50 Eier/m ²				---

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome bzw. Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	Nach Bedarf
--	-------------

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	Nach Bedarf
---	-------------

Zeitlicher Abstand in Tagen	14 mind.
-----------------------------	----------

Anwendungsart	Aufhängen der Kärtchen
---------------	------------------------

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	---
---------------------	-----

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--

Kommentar	
-----------	--



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr.	42
Einsatzgebiet	Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gemüsekulturen (3VEGC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae)	

Anwendungsbereich	Freiland
HuK	Nein
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1.000.000	Eier/ha	max.				---
		Pflanzenhöhe 50 – 125 cm: 500.000 – 1 Mio. Eier/ha				---
		Pflanzenhöhe über 125 cm: 1 Mio. Eier/ha				---
		Pflanzenhöhe bis 50 cm: 500.000 Eier/ha				---

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in
dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der
Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 mind.

Anwendungsart Aufhängen der Kärtchen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr.	43
Einsatzgebiet	Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gemüsekulturen (3VEGC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (1ALEYF, Aleyrodidae)	

Anwendungsbereich	Unter Glas
HuK	Nein
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
10.000	Eier/100 m ²	max.				---
		Pflanzenhöhe 50 – 125 cm: 5.000 – 10.000 Eier/100 m ²				---
		Pflanzenhöhe über 125 cm: 10.000 Eier/100 m ²				---
		Pflanzenhöhe bis 50 cm: 5.000 Eier/100 m ²				---

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in
dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der
Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 mind.

Anwendungsart Aufhängen der Kärtchen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr.	44
Einsatzgebiet	Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Erdbeeren (FRAAN)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	

Anwendungsbereich	Unter Glas
HuK	Nein
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
5.000	Eier/100 m ²				---	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 mind.

Anwendungsart Aufhängen der Kärtchen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr.	45
Einsatzgebiet	Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Beerenobst (3SMFC)	Ausgenommen Erdbeeren

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	
Thripse (1THRIF, Thripidae)	

Anwendungsbereich	Freiland
HuK	Nein
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1.000.000	Eier/ha	max.				---
		Pflanzenhöhe 50 – 125 cm: 500.000 – 1 Mio. Eier/ha				---
		Pflanzenhöhe über 125 cm: 1 Mio. Eier/ha				---
		Pflanzenhöhe bis 50 cm: 500.000 Eier/ha				---

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 mind.

Anwendungsart Aufhängen der Kärtchen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr.	46
Einsatzgebiet	Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Erdbeeren (FRAAN)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	

Anwendungsbereich	Freiland
HuK	Nein
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
500.000	Eier/ha	500.000 Eier/ha				---

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 mind.

Anwendungsart Aufhängen der Kärtchen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr.	47
Einsatzgebiet	Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Beerenobst (3SMFC)	Ausgenommen Erdbeeren

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	
Thripse (1THRIF, Thripidae)	

Anwendungsbereich	Unter Glas
HuK	Nein
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
10.000	Eier/m ²	max.				---
		Pflanzenhöhe 50 – 125 cm: 5.000 – 10.000 Eier/100 m ²				---
		Pflanzenhöhe über 125 cm: 10.000 Eier/100 m ²				---
		Pflanzenhöhe bis 50 cm: 5.000 Eier/100 m ²				---

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	Nach Bedarf
--	-------------

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	Nach Bedarf
---	-------------

Zeitlicher Abstand in Tagen	14 mind.
-----------------------------	----------

Anwendungsart	Aufhängen der Kärtchen
---------------	------------------------

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	---
---------------------	-----

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr.	48
Einsatzgebiet	Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Beerenobst (3SMFC)	Ausgenommen Erdbeeren

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae)	

Anwendungsbereich	Freiland
HuK	Nein
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1.000.000	Eier/ha	max.				---
		Pflanzenhöhe 50 – 125 cm: 500.000 – 1 Mio. Eier/ha				---
		Pflanzenhöhe über 125 cm: 1 Mio. Eier/ha				---
		Pflanzenhöhe bis 50 cm: 500.000 Eier/ha				---

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in
dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der
Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 mind.

Anwendungsart Aufhängen der Kärtchen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr.	49
Einsatzgebiet	Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Beerenobst (3SMFC)	Ausgenommen Erdbeeren

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae)	

Anwendungsbereich	Unter Glas
HuK	Nein
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
10.000	Eier/100 m ²	max.				---
		Pflanzenhöhe 50 – 125 cm: 5.000 – 10.000 Eier/100 m ²				---
		Pflanzenhöhe über 125 cm: 10.000 Eier/100 m ²				---
		Pflanzenhöhe bis 50 cm: 5.000 Eier/100 m ²				---

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in
dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der
Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 mind.

Anwendungsart Aufhängen der Kärtchen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr.	50
Einsatzgebiet	Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Steinobst (3STFC)	
Kernobst (3PMFC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	
Thripse (1THRIF, Thripidae)	

Anwendungsbereich	Freiland
HuK	Nein
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
500.000	Eier/ha/m Kronenhöhe				---	
1.000.000	Eier/ha	max.			---	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in
dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der
Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 mind.

Anwendungsart Aufhängen der Kärtchen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr.	51
Einsatzgebiet	Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Steinobst (3STFC)	
Kernobst (3PMFC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Spinnmilben (1TETRF, Tetranychidae)	

Anwendungsbereich	Freiland
HuK	Nein
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
500.000	Eier/ha/m Kronenhöhe					---
1.000.000	Eier/ha	Max.				---

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 mind.

Anwendungsart Aufhängen der Kärtchen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr.	52
Einsatzgebiet	Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Erdbeeren (FRAAN)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	

Anwendungsbereich	Haus- und Kleingartengebiet: Freiland, Unter Glas
-------------------	---

HuK	Ja
-----	----

Art. 51	Nein
---------	------

Art. 53	Nein
---------	------

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
50	Eier/m ²				---	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome bzw. Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	Nach Bedarf
--	-------------

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	Nach Bedarf
---	-------------

Zeitlicher Abstand in Tagen	14 mind.
-----------------------------	----------

Anwendungsart	Aufhängen der Kärtchen
---------------	------------------------

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	---
---------------------	-----

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr. 53
Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kernobst (3PMFC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland

HuK Ja

Art. 51 Nein

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
50	Eier/m ² /m Kronenhöhe					
100	Eier/m ²	max.			---	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome bzw. Schadorganismen				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung Nach Bedarf

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr Nach Bedarf

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 mind.

Anwendungsart Aufhängen der Kärtchen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Chrysoperla, 4282-0

Nr.	54
Einsatzgebiet	Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Woll- oder Schmierläuse (1PSEUF, Pseudococcidae)	

Anwendungsbereich	Haus- und Kleingartengrenzbereich: Unter Glas
-------------------	---

HuK	Ja
-----	----

Art. 51	Nein
---------	------

Art. 53	Nein
---------	------

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
100	Eier/m ²	max.				---
		Pflanzenhöhe 50 - 125 cm: 50 - 100 Eier/m ²				---
		Pflanzenhöhe über 125 cm: 100 Eier/m ²				---
		Pflanzenhöhe bis 50 cm: 50 Eier/m ²				---

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befall bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome bzw. Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	Nach Bedarf
--	-------------

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	Nach Bedarf
---	-------------

Zeitlicher Abstand in Tagen	14 mind.
-----------------------------	----------

Anwendungsart	Aufhängen der Kärtchen
---------------	------------------------

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	---
---------------------	-----

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--

Kommentar	
-----------	--



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!

<http://www.baes.gv.at/impressum>